

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,  
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)  
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 81 de Juin 1967

1967- 18

## AVERTISSEMENTS

### VIGNE

Black-Rot - Mildiou : Depuis la semaine dernière, la végétation est devenue très active et plusieurs feuilles nouvelles se sont développées. En outre, on approche de la floraison et les risques d'orages persistent.

Pour le Black-Rot, à cause des nombreuses taches qui viennent d'apparaître un traitement devrait être appliqué dès à présent dans les parcelles situées en bordure des vignes incultes et dans les foyers habituels.

Pour le Mildiou où les risques sont encore faibles, le traitement pourra être retardé jusqu'à la fin de la semaine.

## INFORMATIONS

Oïdium : Les conditions climatiques sont favorables à la maladie. Un traitement, de préférence par poudrage, est à prévoir dans le courant de la semaine prochaine.

## AVERTISSEMENTS

### ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Pommes et des Poires : Le vol de papillons est particulièrement important depuis le 27 mai. La température est très favorable aux pontes, dont on attend les premières éclosions, dès à présent.

En conséquence, appliquer dès réception de ce bulletin un premier traitement insecticide.

Tavelures des Pommiers et des Poiriers : Dans les vergers où des taches ont été observées, un fongicide devrait être incorporé à la Bouillie insecticide.

Carpocapse des Prunes : Le vol des papillons se poursuit sans marquer d'intensité particulière. Les pontes, peu nombreuses jusqu'à la fin du mois de mai, permettent de repousser le second traitement au 10 juin.

## INFORMATIONS

Rouille du Prunier : Le traitement conseillé dans notre Bulletin du 18 mai devrait être renouvelé.

Adjoindre un fongicide à la Bouillie préconisée contre le Carpocapse.

.../...

.../...

POUMES DE TERRE

Mildiou - Doryphore : Dans les cultures suffisamment développée, un traitement devrait être envisagé dès à présent.

Si on observe la présence de larves de Doryphores dont la taille sera au moins égale à celle d'un grain de blé, on ajoutera un insecticide à la bouillie préconisée contre le Mildiou.

- N O T E -

A PROPOS des CECIDOMYIES des CEREALES - Nous avons appris que certains céréaliculteurs envisageaient dès cette année d'appliquer des traitements insecticides contre ces ravageurs. Il est bon de rappeler que si le Lindane s'est effectivement montré efficace contre ces insectes au cours de l'expérimentation poursuivie en 1966, trop d'inconnues subsistent encore pour qu'on puisse envisager d'appliquer des traitements sur les blés autrement qu'à titre expérimental. Telles sont les conclusions du Service de la Protection des Végétaux.

Cette prudence est d'autant plus justifiée que l'on peut toujours craindre que les résidus de Lindane sur les grains récoltés n'excèdent les tolérances admises par certains pays importateurs de nos céréales.

Bordeaux, le 6 Juin 1967

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU